

Simon, E. 1889. Etudes arachnologiques. 21e Mémoire. XXXI. Descriptions d'espèces et the genres nouveaux de Madagascar et de Mayotte. Ann. Soc. ent. Fr. (6) 8: 233-234.

Genus VIRIDASIUS, nov. gen.

Præcedenti affinis. Cephalothorax humilior et latior fere ut in *Sparrasso*. Oculi medii magni æqui, aream subparallelam, vix longiorem quam latiore, occupantes. Clypeus oculis anticis saltem duplo latior. Pedes sat robusti, longi, IV, I, II, III. Tibiæ quatuor anteriores aculeis inferioribus longis 4-4 et utrinque lateralibus binis munitæ.

16. VIRIDASIUS PULCHRIPES, sp. nov., ♂. — Long. 21 mill. — Cephalothorax fusco-ravidus, fulvo-cervino longe et dense pubescens, lineolis radiantibus numerosis, fusco-marginatis, pallidiore pilosis, ornatus. Clypeus, sub oculis, lineis albis binis notatus. Abdomen breviter oblongum, postice leviter ampliatur, fulvo-cervino crebre pilosum, maculis nigricantibus quatuor in trapezium ordinatis leviter lunatis et antice albido-marginatis, et subtus lineis tenuibus fuscis trinis parum expressis, ornatum. Chelæ longæ, subnigræ, nitidæ, transversim subtilissime rugatæ, ad basin et extus crasse fulvo-hirsutæ. Pedes longi, fusco-rufescentes, femoribus supra albido-pubescentibus et maculis intense nigris (basilari, submedia et subapicali latiore) ornatis, tibiis metatarsisque subnigris et annulis binis sat angustis (medio et apicali) niveo-pilosis eleganter sectis. Pedes-maxillares obscure fulvi, tibia tarsoque infuscatis; femore compresso, subrecto, supra ad apicem 4-4 aculeato; patella sat minuta, parallela, non multo longiore quam latiore, aculeata; tibia patella longiore et graciliore, supra ad basin longe aculeata, extus apophysibus duabus armata, apophysi prima subbasilari divaricata longa sat crassa sed ad apicem gracili acutissima et valde recurva, antice, prope medium, insisura et dente acuto munita, apophysi altera multo minore, simpliciter conica; tarso ovato, longe attenuato; bulbo sat complicato, dimidium tarsi parum superante, ad basin rufulo et convexo, ad apicem depresso et laminis nigris obliquis munito.

♀. — Long. 25 mill. — Ut in mare. Plaga vulvæ (haud perfecte adulta) fulva, semi-circularis, sulcis duobus longitudinalibus impressa. — Nossi-Bé (Legras).