

Strand, E. 1907. Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. Zool. Anz. 31: 738-739.

Vulsor quartus Strand n. sp.

♀. Cephal. und Extrem. bräunlichgelb, ersterer mit zwei schwarzen Längsflecken jederseits und 4—5 ähnlichen an der hinteren Abdachung, letztere an den Femoren oben undeutlich dunkler gefleckt. Abdomen graubräunlich mit zwei schwarzen Basalflecken und hinter diesen zwei parallelen Längsreihen von je drei schwarzen Längsflecken. Epigyne: $1,6 \times 1,6$ mm, etwa viereckig, hinten leicht erhöht, mit zwei schmalen, tiefschwarzen, eine Y-förmige Figur bildenden Längsfurchen. Alle Tibien unten 2, 2, 2, vorn und hinten je 1, 1, III—IV außerdem oben 1, 1; Metat. I—II unten 2, vorn und hinten je 1, III unten 2, 1, 1, vorn und hinten je 1, 1, 1, IV unten 2, 2, 3, vorn 1, 1, 1, hinten 1, 1, 1, 1 Stacheln. Höhe des Clypeus geringer als die Länge des mittleren Augenfeldes; vordere M.-A. unbedeutend kleiner als die hinteren, unter sich um $\frac{2}{3}$ ihres Durchmessers, von den hinteren M.-A. um reichlich denselben entfernt; das Feld der M.-A. länger als breit und fast ebenso breit vorn wie hinten. Eine die vorderen S.-A. oben und die hinteren M.-A. unten tangierende Linie würde gerade sein. — 17,5 mm. Cephal. $8,2 \times 6,8$ mm. Abd. 8×5 mm. Beine: I=II. 33,7; III. 30,3; IV. 39,2 mm. — Nossibé (Reuter) [M. L.].