

Strand, E. 1907. Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. Zool. Anz. 31: 739.

Vulsor quintus Strand n. sp.

♀. Cephal. und Extremit. hellgelb, ersterer mit wenigen schwarzen Sprenkeln, Augenfeld und Mitte des Clypeus schwarz; Mand. rötlich braungelb mit dunklerem Schrägstreif; Femoren und Tibien mit Andeutung dunklerer Ringe. Abdomen oben graubräunlich mit hellerem Herzstreifen und zwei aus je sieben graulichen Fleckchen gebildeten Längsreihen, unten und an den Seiten graugelblich mit dunkleren Schattenflecken. Epigyne so breit als lang, hinten querschnittsen, mitten niedergedrückt, beiderseits von einem dicken Längswulst begrenzt, vorn mitten mit einer kleinen lochförmigen Grube, die sich jederseits nach außen als ein den Längswulst quer durchbohrendes Rohr fortsetzt. Feld der M.-A. vorn und hinten gleich breit, länger als breit; die vorderen M.-A. ein wenig kleiner, unter sich um reichlich ihren Radius, vom Clypeusrande um ihren $1\frac{1}{2}$ Durchmesser entfernt. Eine die hinteren M.-A. vorn tangierende Gerade würde die S.-A. oben nur sehr wenig schneiden. — Cephal. $5,2 \times 4,3$ mm. Abdomen $7 \times 4,5$ mm. Beine: I. 21; II. 20,7; III. 19,9; IV. 26 mm. — Nossibé [M. L.].