

Strand, E. 1907. Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. Zool. Anz. 31: 740.

*Vulsor septimus* Strand n. sp.

♀. Cephal. dunkelbraun, mit rötlicher Mittelbinde und verwischten ebensolchen Seitenbinden, Mandibeln fast schwärzlich, Sternum rot, Beine rötlich, Femoren oben schwarz gefleckt. Abdomen ockerfarbig braungelb, oben mit hellerer, an der Basis schwarz begrenzter Längsbinde. Epigyne  $1,6 \times 1,4$  mm, abgerundet viereckig, vorn mit einer tiefen, rundlichen Grube, die fast gänzlich von einem lang herzförmigen Septum erfüllt wird und sich nach hinten als eine tiefe, am Hinterende dreieckig erweiternde Furche fortsetzt. — Feld der M.-A. vorn schmaler als hinten und so lang als hinten breit. Vordere M.-A. kleiner als die hinteren, unter sich um kaum ihren Radius, vom Clypeusrande um  $1\frac{1}{3}$  des Durchmessers, von den vorderen S.-A. um fast den Durchmesser entfernt. — 21 mm. Cephal.  $9,8 \times 8$  mm. Abd.  $11 \times 8$  mm. Beine: I. 29; II. 27,9; III. 27,3; IV. 34,4 mm. — Majunga (Voeltzkow) [M. B.].