

Strand, E. 1907. Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. Zool. Anz. 31: 739-740.

Vulsor sextus Strand n. sp.

♀. Cephal. braun, heller und dunkler marmoriert, mit bräunlichgelber Rückenbinde und verwischter hellerer Seitenbinde, Augenfeld und Mitte des Clypeus schwarz, Mandibeln braunrot, Unterseite sowie Extrem. hell bräunlichgelb, alle Femoren oben mit schwarzem Basalfleck und zwei dunklen Halbringen. Abdomen hell graulichgelb, an den Seiten dicht dunkler gesprenkelt, insbesondere vorn; Unterseite einfarbig hellgelb. Epigyne $1,2 \times 0,9$ mm, hellbraun, leicht gewölbt, glänzend, glatt, hinten mit schmaler Längsfurche, vorn mit kleiner, tiefer, von einem schmalen, hinten erweiterten Längsseptum geteilter Grube. Vordere M.-A. kleiner als die hinteren, unter sich um kaum ihren Radius, Clypeusrande um kaum mehr als ihren Durchmesser entfernt. Vordere S.-A. winzig klein, mit dem Unterrande der hinteren M.-A. eine fast gerade Reihe bildend. — 14 mm. Cephal. 5×4 mm. Abd. $8 \times 4,5$ mm. Beine: I. 16,1; II. 16,4; III. 15; IV. 19,5 mm. Palpen 6,1 mm; Tars. kürzer als Patella + Tibialglied (bzw. 1,9 und 2,2 mm). — Majunga (Mad.) (Voeltzkow) [M. B.].