

Strand, E. 1907. Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. Zool. Anz. 31: 727-728.

*Zelotes madagascariensis* (Strand, 1907)

*Prothesima madagascariensis* Strand n. sp.

♂. Cephal. und Mand. dunkel rötlichbraun, ersterer mit schwarzem Augenfeld und Rand, Beine geschwärzt, Metat. und Tarsen, sowie Oberseite der Patellen rötlich braungelb. Abd. schwarz, an der Basis oben mit dunkelbrauner, trapezförmiger Hornplatte. Tibien I unbewehrt, II unten mitten 1, III unten 2, 2, 2, vorn 1, 1, hinten 1, 1, 1, IV unten 2, 2, 2, vorn 2, 1, hinten 2, 2 Stacheln. Metat. I unbewehrt, II unten submedian 2, III unten 2, 2, vorn und hinten etwa 1, 1, 2, IV hinten 1, 2, 2, sonst wie III. — Hintere Augen etwa gleichgroß und um ihren Radius unter sich entfernt. Vordere Reihe stark procurva, die M.-A. ein wenig kleiner, unter sich um ihren Radius, von den S.-A. um weniger entfernt. — Tibialfortsatz von außen gesehen am Ende schräg geschnitten erscheinend. — Bulbus hat vor der Mitte einen kurzen Höckerfortsatz und zwischen diesem und dem Ende des Gliedes eine kleine, horizontal gerichtete Spitze. — 6 mm. Cephal.  $2,7 \times 2$  mm. Beine: I 7,3; II 6,3; III 5,3; IV 8,1 mm. — Nossibé [M. L.].