

Strand, E. 1907. Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. Zool. Anz. 31: 729-730.

Gen. *Tmeticides* Strand n. g. *Argiopidarum*.

Mit *Tmeticus* (M.) Sim. bzw. *Centromerus* (D.) Kulcz. verwandt, aber die hintere Augenreihe recurva und deren Augen unter sich weiter entfernt, Clypeus niedriger, der untere Falzrand mit wenigeren (3) Zähnen, die Körperform kürzer, robuster, mehr *Aranca*-ähnlich, die Spinnwarzen nicht terminal. — Type: *T. araneiformis* Strand.

*Tmeticides araneiformis* Strand n. sp.

♀. Cephal. mit allen Anhängen lebhaft orangegelb, Augenfeld tiefschwarz. Abdomen graugelb, oben mit vier braunen, scharf markierten Muskelpunkten, sowie am Hinterende des Rückens zwei kurz ellipsenförmigen, in Querreihe gestellten, tiefschwarzen Flecken, die um das Doppelte ihres kürzesten Durchmessers unter sich entfernt sind. — Epigyne: ein brauner, nach vorn schräg, nach hinten fast senkrecht abfallender, einen Querkamm bildender Hügel, der vorn eine Grube hat von welcher eine feine, sich hinten gabelnde Längsfurche entspringt. — 3,5 mm. — Nossibé [M. I.].