

Simon, E. 1894. Histoire naturelle des araignées. Paris, 1: 653-654.

*Thapsagus pulcher* Simon, 1894

**Thapsagus** nov. gen.

Ab *Araeonco*, cui affinis est, differt oculis posticis in lineam plane rectam, majoribus, inter se æquis, fere æque et sat anguste distantibus (spatiis interocularibus oculis non latioribus), pedes brevioribus et tarsis anticis metatarsis non multo brevioribus (mas ignotus).

TYPUS : *T. pulcher* E. Sim. (sp. nov.) (1).

AR. GEOGR. : ins. Madagascar.

---

(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :

**T. pulcher**, sp. nov. — ♀. Long. 1,3 mill. — Cephalothorax sat longe ovalis, fulvo-  
infuscens, linea marginali nigra et macula media fusca, acute triquetra et antice tri-  
lobata, ornatus. Oculi postici in lineam subrectam, inter se fere æque et non late  
distantes, medii lateralibus paulo majores. Oculi antici in lineam evidenter recurvam,  
medii inter se contigui, a lateralibus late remoti. Abdomen magnum, convexum,  
breviter ovatum, pallide luteum, supra linea media angusta et integra et utrinque  
vitta marginali latissima nigris, ornatum. Sternum castaneum, læve et nitidum.  
Pedes sat breves, omnino luridi. — Madagascar.