

Strand, E. 1907. Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. Zool. Anz. 31: 744-745.

*Pardosa zorimorpha* (Strand, 1907)

*Lycosa zorimorpha* Strand n. sp.

♀. Färbung und Zeichnung sehr an unsre einheimischen *Zora*-Arten erinnernd. — Epigyne hinten erhöht und scharf abgesetzt, vorn mit einer schwarzen Längsgrube, hinten jederseits mit einer leicht gekrümmten Längsgrube. Das Ganze von Haaren überragt. — Vordere Augenreihe etwa gerade, kürzer als die zweite; die Augen gleichgroß, und zwar ziemlich klein, unter sich um ihren Durchmesser, die S.-A. von den Augen II fast um den doppelten, vom Clypeusrande fast um den vierfachen Durchmesser entfernt. Tibien I—II unten 2, 2, 2 Stacheln, die insbesondere an I sehr lang sind. Vorn und hinten je 1 Stachel, III—IV unten 2, 2, 2, vorn, hinten und oben je 1, 1 Stacheln. Metat. I bis II unten 2, 2, 2, von denen die vier proximalen sehr lang sind, vorn und hinten je 1, 1 kurze Stacheln, III unten 2, 2, 3, vorn und hinten je 1, 1, 1, IV unten 1, 2, 2, 3, vorn und hinten je 1, 1, 1 Stacheln. — 7,5 mm. Ceph. 3 × 2,3 mm. Abd. 4 × 2,3 mm. Beine: I. 10,4; II. 9,7; III. 8,9; IV. 14 mm. Nossibé [M. I.].