

Hostus, nov. gen.

Ab *Oxyope* tantum differt oculis scr. 2^{ae} (lateralibus anticis) reliquis oculis multo majoribus, valde prominulis, spatio oculo haud latiore a sese distantibus, laminis brevioribus apice recte sectis haud acuminatis.

TYPUS : *H. paroculus* E. Sim. (1).

AR. GEOGR. : Ins. Madagascar.

(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :

H. paroculus, sp. nov. — ♂. Long. 4,5 mill. — Cephalothorax laevis, luridus, area oculorum nigra albo-squamulata. Abdomen pallide testaceum, antice obtuse truncatum et excisum, postice acuminatum. Chelæ, sternum pedesque pallide lurida, hi acuteis nigris longis tenuibus et numerosis armati. Pedes-maxillares luridi, tarso fusco, patella aculeo longissimo supra ad apicem armata, tibia brevi, extus ad apicem apophysi nigra brev; cariniformi et subtriquetra armata, tarso late ovato, ad marginem exteriorem, prope basin, minute dentato. — Ins. Madagascar : Santa-Maria.




Fig. 375—376.

Fig. 375. *Hostus paroculus* E. Sim. Yeux vus en dessus. — Fig. 376. *Oxyopes lineatus* Latr. Idem.