

Strand, E. 1906. Diagnosen nordafrikanischer, hauptsächlich von Carlo Freiherr von Erlanger gesammelter Spinnen. Zool. Anz. 30: 660.

97. *Oxyopes pallidecoloratus* Strand n. sp.

♀. Cephal. blaßgelb, Kopfteil mit weißem Querfleck, Brustteil mit braunen Seitenbinden, Rand nicht dunkler. Clypeus mit zwei nach unten divergierenden tiefschwarzen Linien, die sich auf die Mandibeln fortsetzen. Sternum und Coxen weißlich, fein unterbrochen schwarz umrandet. Abdomen weiß, dunkelgrau netzgeadert und mit dunkelgrauem, sich dreimal erweiterndem Herzstreif. Bauchbinde schwärzlich, heller gesprenkelt. Hintere M.-A. unter sich um kaum, von den S.-A. um den doppelten Durchmesser entfernt. Epigyne bildet eine seichte Grube, deren schwarze, breit erhöhte, etwas gefurchte Hinterrand einen Fortsatz entsendet, der zuerst nach unten, dann schräg nach vorn und wieder gegen den Bauch gerichtet ist, zuerst stark, dann schwach verschmälert, an der Basis breit zungenförmig, dann fingerförmig ist; die Spitze mit einem kleinen, fast viereckigen, stark gekörneltten Knopf versehen. 6 mm lang. Cephal. $2,5 \times 1,7$ mm, Abdomen $3,5 \times 2$ mm. Beine: I. 9,5; II. 8,4; III. 6,8; IV. 8,8 mm. Patella -|- Tibia IV 2,5 mm. Akaki-Luk Aballa (v. Erlanger).