

Strand, E. 1907. Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. Zool. Anz. 31: 742.

*Dolomedes saccolavus* Strand n. sp.

♀ subad. Cephal. und Extrem. rötlich braungelb, am Rande eine schmale grauliche und über dieser eine deutlichere Submarginalbinde, über die Kopfnitte ein weißlicher Längsstrich. Abdomen ockerfarbig gelbblichbraun mit hellgelbem Herzstreif und zwei nach hinten leicht divergierenden Reihen von je 4 Muskelpunkten; Seiten leicht gerötet, oben mit bräunlichem Längsstrich. — Vordere Augenreihe so schwach recurva, daß eine die S.-A. unten tangierende Gerade die M.-A. kaum im Centrum schneiden würde; die Augen gleichgroß, unter sich um ihren Radius, die M.-A. von den hinteren M.-A. um ihren Durchmesser entfernt; Entfernung vom Clypeusrande gleich der Länge des mittleren Augenfeldes. Hintere M.-A. unter sich um reichlich den Radius, von den S.-A. um den Durchmesser entfernt. — Alle Tibien unten 2, 2, 2, 2, vorn, hinten und oben je 1, 1, alle Metatarsen unten 2, 2, 3, vorn und hinten je 1, 1, 1 Stacheln; alle Patellen vorn, hinten und oben an der Spitze je 1 Stachel. — Am unteren Falzrande vier gleichgroße Zähne. — 14 mm (NB. unreif!) Cephal.  $7 \times 6,2$ , mm. Abd.  $7,2 \times 4,3$  mm. Beine; I. 27,4; II. 26,4; III. 25,4; IV. 29,7 mm. — Nossibé (Reuter) [M. L.].