

Blandin, P. 1975. Etudes sur les Pisauridae africaines III. Les espèces des genres *Perenethis* L. Koch, 1878 et *Maypaci* Simon, 1898 (Araneae - Pisauridae- Pisaurinae). *Revue Zool. afr.* 89: 385.

1. *Maypaci vittiger* Simon, 1898 (Fig. 13)

Pour le détail des synonymies concernant cette espèce et les deux suivantes, je renvoie le lecteur à mon article (Blandin, 1974a).

Matériel étudié.

1 ♀, avec cocon, Tananarive, MNHN, ES n° 16029; lectotype (Blandin, 1974a).

Le nom de *M. vittiger*, comme cela a déjà été expliqué, doit être réservé exclusivement à l'exemplaire de Tananarive, tandis que ceux du Tanganyika décrits conjointement par Simon doivent être classés dans *M. stuhlmanni* (Bös. et Lenz, 1894).

La comparaison des figures 13 et 15 montre de fait que les épigynes de ces deux espèces sont sensiblement différents. Chez *M. vittiger* l'épigyne est subcirculaire, les branches latérales du septum font entre elles un angle obtus dont le sommet est dirigé vers l'avant; les fossettes en doigts de gant sont réduites.

Il y a également, semble-t-il, des différences entre les ornements abdominaux, autant que l'on puisse en juger d'après des exemplaires qui sont assez mal conservés. *M. vittiger* paraît avoir l'abdomen recouvert d'une pilosité uniforme, assez claire.

*M. vittiger* compte parmi les grandes espèces du genre : le céphalothorax du lectotype a une longueur de 4 mm, la longueur totale du corps étant de l'ordre de 14 mm.

Le mâle est inconnu.

