

Blandin, P. 1979. Etudes sur les Pisauridae africaines XI. Genres peu connus ou nouveaux des Iles Canaries, du continent africain et de Madagascar (Araneae, Pisauridae). Revue Zool. afr. 93: 347-375.

Paracladycnis vis n. sp.

La figure 8 représente en vue dorsale la femelle holotype. Il s'agit d'une grande araignée: la longueur céphalothoracique est de 6 mm environ, la longueur totale du corps étant de l'ordre de 14 mm. Le céphalothorax est remarquable par sa grande largeur. Il est recouvert d'une pilosité dorsale brune dans la région médiodorsale, blanche sur les marges. En arrière du groupe oculaire, deux lignes de poils blancs dessinent une figure pyriforme. L'abdomen porte un folium dorsal probablement largement recouvert de poils bruns (la pilosité n'est pas en très bon état); les flancs sont clairs. La face ventrale est également claire, avec sans doute des variations d'un individu à l'autre: la femelle immature montre par exemple un sternum un peu plus sombre avec une ligne médiane claire. Les pattes, qui portent de fortes épines, sont marbrées plus ou moins distinctement sur leurs faces dorsales et largement assombries en face ventrale (surtout les P_3 et P_4).

Matériel étudié:

1 ♀ adulte, holotype, 1 ♀ immature, paratype. Tananarive (Madagascar) MNHN, ES n° 26227.

