

Simon, E. 1901. Etudes arachnologiques. 31e Mémoire. XLVIII.
 Etude sur les *Heliophanus* d'Afrique et de Madagascar.
 Ann. Soc. ent. Fr. 70: 53.

Heliophanus imerinensis Simon, 1901

2. *H. imerinensis*, sp. nov. — ♂ long. 4 mill. — Cephalothorax niger, supra laevis, versus marginem subfilitate coriaceus, squamulis viridi-micantibus vestitus et linea exili albo-pilosa cinctus. Pili oculorum pauci, albidi. Clypeus fere nudus, angustus, retro obliquus. Abdomen nigrum, fulvo-aeneo-squamulatum, ad marginem anticam maculis binis longis vittam interruptam formantibus, utrinque, prope medium, puncto parvo, dein linea transversa subrecta albo-luteo-squamulatis or-

natum, subtus parce albo-pilosum. Chelae nigrae, praesertim intus rugosae. Femoribus nigris, coxis, patellis, tibiisque fusco-rufulo-castaneis, metatarsis tarsisque dilutioribus, parce albido-squamulatis et guttatis, tibiis metatarsisque anticis (curvatis) tenuiter et longissime setosis, tibiis 1^{is} paris subtus aculeis 3-2 aculeoque laterali interiore subapicali armatis. Pedes-maxillares (fig. 3) femore-nigro, late compresso, subtus apophysi media longa teretiuscula et recta sed apice minute intus uncata (fig. 3 a) armato; tibia patella multo




Fig. 3. Fig. 3 a.

breviore extus ad marginem apophysi parva brevi, tenui et curvata munita.

Madagascar : Imerina (Camboué).