

Strand, E. 1907. Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. Zool. Anz. 31: 746.

Heliophanus nossibeensis Strand n. sp.

♀. Dunkelbraun, violettlich angeflogen, an den Seiten rötlicher. Abdomen mit Andeutung eines dunkleren Herzstreifens, sowie je einer weißen Querbinde nahe der Basis und am Anfang des letzten Drittels des Rückens. Beine gelb, I am Ende der Femoren vorn, an der Basis der Patellen oben und am Ende der Tibien, IV in ähnlicher Weise schwärzlich gefleckt. Epigyne: eine dunkelgefärbte, tiefe, hinten querschnittene Grube. — 3,3 mm. Cephal. $1,8 \times 1,2$ mm. Abd. $2 \times 1,5$ mm. — ♂ 2,7 mm. Cephal. $1,5 \times 1$ mm. Dunkler. Palpenfemur mit einem von der Mitte der unteren Hälfte der Außenseite entspringenden, von breiter Basis in eine kurze, scharfe Spitze übergehenden, schräg nach unten gerichteten, fast geraden Fortsatz, der so lang als das Glied an der Basis breit ist. Tibialglied oben etwa $\frac{1}{3}$ so lang als das Patellarglied. — Nossibé [M. L.].