

Strand, E. 1907. Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. Zool. Anz. 31: 748.

*Hyllus interrogationis* (Strand, 1907)

*Malloneta* (?) *interrogationis* Strand n. sp.

♂. Kopfplatte schwarzbraun, Seiten dunkelbraun, Rand und Augenringe tiefschwarz; hinter den Augen III je ein rötlichgelber, halbmondförmig gebogener Querstreif, welche sich nach vorn unter den Augen fortsetzen. Mand. rotbraun, Mundteile dunkelbraun. Sternum und Coxen III—IV braungelb, Coxen I—II dunkelbraun. Beine I—II dunkelbraun mit gelblichen Met. und Tarsen, schwärzlichen Femoren, III—IV bräunlichgelb, Femoren mit breitem schwarzen Endring. — Von *Malloneta* abweichend: hintere Metat. nicht länger als die Tibien und ihre Stacheln ebenso kräftig; Vorderbeine unten kurz, aber dicht behaart. — Patellarglied reichlich noch  $\frac{1}{2}$  mal so lang als breit, Tibialglied am Ende erweitert, schräg geschnitten und außen vorgezogen, sowie daselbst oben und innen mit langer Bürste, die Länge  $2\frac{1}{3}$  der Breite; der Tibialfortsatz erscheint von außen gesehen am Ende nur wenig verschmälert, daselbst aber tief ausgerandet und in zwei feine, fast gleichgroße und parallele Spitzen ausgezogen. Tarsalglied noch  $\frac{1}{2}$  mal breiter als das Tibialglied, Bulbus klein, flach, scheibenförmig, breit eiförmig, reichlich bis zum Anfang des letzten Drittels der Unterseite der Lamina reichend. — Cephal.  $3,7 \times 2,6$  mm. Beine: I. 6,75; II. 6,2; III. 7,4; IV. 6,6 mm. Glieder IV: Fem. 2,1; Pat. 1; Tib. 1,3; Met. 1,3; Tars. 0,9 mm. Palpen 3,4 mm. — Nossibé (Voeltzkow) [M. B.].