

Strand, E. 1907. Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. Zool. Anz. 31: 747-748.

*Hyllus virgillus* Strand n. sp.

♀ subad. Schwarz, am Ceph. etwas bräunlich, am Abd. etwas graulich. Brustteil mit braungelblichem, wahrscheinlich weißbehaartem Mittellängsstreif. Patellen mit zwei helleren Längsstrichen, Tarsen braungelb. Abdomen mit grauweißlichem, querem Basalfleck, von welchem zwei schmale weißliche Längsstriche entspringen; hinter diesen ein undeutlicher Längsstreif. An den Seiten kurz hinter der Mitte ein großer grauweißer und vor und hinter diesem je ein kleinerer ebensolcher Fleck. Bauch graulich mit vier dunklen Punktreihen. Alle Patellen vorn 1, III—IV auch hinten 1 Stachel, Tibien I—II unten 2, 2, 2, vorn 1, 1, III—IV unten vorn 1, 1, unten hinten 1, vorn und hinten je 1, 1, 1, oben anscheinend keine. Metat. I—II unten 2, 2, III mit vollständigem apicalen und einem aus 4 Stacheln bestehenden submedianen Verticillus; IV mit apicalem Vertic. wie III, außerdem einem submedianen von etwa drei und subbasalen von 2 Stacheln gebildet. — Vordere M.-A. um ihren Radius, von den S.-A. um den Radius der letzteren entfernt. — 7,5 mm. (NB. unreif!) Cephal. 3,2 × 2,3 mm. Abd. 4,6 × 2,6 mm. Beine: I. 5,9; II. 5,15; III. 6,75; IV. 6,15 mm. — Nossibé [M. L.].