

Myrmarachne longiventris (Simon, 1903)

P. 496.

22. MYRMARACHNEÆ

J'ajoute à ce groupe le genre *Bizone*, qui diffère de ses congénères par sa partie thoracique plus longue et à peine plus basse que la céphalique, à peine atténuée, non inclinée en arrière, où elle est tronquée et en continuité avec le bord antérieur tronqué, d'un abdomen plus de cinq fois plus long que large et très longuement acuminé, avec les filières terminales et longues.

Les yeux antérieurs, très inégaux et contigus, sont en ligne procurvée; le groupe oculaire est un peu plus long que large, parallèle et aussi large que le céphalothorax, avec les yeux postérieurs débordants et les yeux de la 2^e ligne situés un peu avant le milieu.

Les pattes sont courtes et peu robustes; celles de la 1^{re} paire ont le tibia armé de 4-4 épines assez longues, le métatarso, beaucoup plus court, armé de 2-2 épines semblables, le tarse assez épais et un peu fusiforme; les autres pattes sont mutiques.

Les chélicères et les pattes-mâchoires de la femelle (seule connue), le sternum et les hanches, distantes les unes des autres, ne diffèrent pas de ceux des *Myrmarachne* les plus étroits.

Ce genre ne comprend qu'une seule espèce de Madagascar, *B. longiventris* E. Sim., étroite et très longue, d'un noir brillant avec les pattes jaunes.

Bizone, nov. gen.

Cephalothorax plus triplo longior quam latior, parte cephalica parallela fere plana, thoracica longiore et vix humiliore, leviter et sensim attenuata, postice haud declivi et recte truncata. Oculi antici inter se contigui, medii maximi, apicibus in lineam leviter procurvam. Clypeus angustus. Quadrangulus paulo longior quam latior, subparallelus et cephalothorace non angustior. Oculi postici prominuli. Oculi ser. 2^{ae} paulo ante medium siti. Abdomen plus quintuplo longius quam latius, antice truncatum, leviter fusiforme, postice longissime acuminatum, mamillis apicalibus longis. Chelæ feminæ breves, pedes-maxillares feminæ dilatati, partes oris sternumque fere *Myrmarachnæ*. Coxæ ad basin globosæ, inter se (præsertim coxa 2ⁱ paris a coxa 3ⁱ paris) distantes. Pedes graciles et breves, ita longitudine IV, I, II, III, trochantere 4ⁱ paris coxa vix brevior. Pedes 1ⁱ paris tibia aculeis sat longis 4-4, metatarso, tibia multo brevior, aculeis similibus 2-2 subtus armatis, tarso leviter ovato. Reliqui pedes mutici.

TYPUS : *B. longiventris* E. Simon (1).

AR. GEOGR. : Madagascar.

(1) Espèce inédite, dont voici la diagnose :

B. longiventris, sp. nov. — ♀. Long. 6 mill. — Cephalothorax nigro-nitidus, parte thoracica subtilissime transversim striata. Abdomen longissimum, nigro-nitidum, glabrum. Pedes-maxillares, chelæ, partes oris sternumque nigra vel castanea, parte labiali apice testacea. Pedes flavidi, metatarso 1ⁱ paris coxaque 4ⁱ paris vix infuscatis. — Madagascar : Sakavalana.