

Strand, E. 1908. Neue aussereuropäischer Spinnen.
Zool. Anz. 33: 5-7.

Pharucocerus ebenauensis Strand n. sp.

♀. Augenfeld hinten kaum schmaler als vorn, Augen II um ihren Durchmesser von den Augen III entfernt und ein wenig kleiner als die S.-A. I. Vordere Augenreihe fast gerade, die M.-A. sich berührend, vom Clypeusrande um weniger als ihren Radius, von den S.-A. um weniger als den Radius der letzteren entfernt. — Metatarsen I ohne Lateralstacheln, II innen mit 1, 1 großen ebensolchen; der basale Verticillus des Metatarsus IV ohne dorsalen Stachel. — Epigyne erscheint in Flüssigkeit als ein braunes, fast halbkreisförmiges Feld, das vorn zwei weißliche, schräg gestellte, nach hinten divergierende Flecke zeigt; trocken gesehen weist das Genitalfeld vorn eine hufeisenförmige, hinten offene Grube auf, deren Vorderrand zugleich den Rand der Epigyne bildet, während die Seitenränder innerhalb des Randes der Epigyne fallen. — 10–11 mm. Cephal. $4,5 \times 3,5$ mm. Abdomen $6 \times 4,5$ mm. — Nossibé (Ebenau).