

Simon, E. 1902. Etudes arachnologiques. 31e Mémoire. LI.
Descriptions d'espèces nouvelles de la famille des Salticidae (suite).
Ann. Soc. ent. Fr. 71: 408.

Phaulostylus leucolophus Simon, 1902

P. leucolophus, sp. nov. — ♀ long. 7-8 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, parte cephalica, saltem prope oculos, fere nigra, rubro-pilosus, vitta media, marginem frontalem haud attingente, sat lata, postice sensim attenuata, vittaque submarginali, postice interrupta, niveo-pilosis ornatus. Pili oculorum aurantiaci. Clypeus angustus, pilis niveis, valde clavatis et pediculatis, conspersus. Abdomen supra fuscum vel obscure testaceum, rubro-pubescent, linea marginali angusta vittaque media paulo latiore et integra testaceis et albo-pilosis ornatum, subtus fuscum. Chelae nigro-castaneae, transversim striolatae, extus glabrae, intus sat crebre et tenuiter albido-pilosae, longissimae (cephalothorace saepe vix breviores), attenuatae et valde divaricatae, marginibus sulci longissimis, leviter depressis et carinulatis, utrinque ad apicem, prope radicem unguis, tuberculo compresso subacuto et dentiformi armatis, dentibus remotissimis, margine superiore, an angulum leviter prominulum, dentibus parvis trinis, inferiore dente longiore sat gracili atque acuto, armatis, ungue longissimo tereti, bisinuoso. Partes oris, sternum coxaeque fusco-castanea. Pedes fulvo-rufescentes, femoribus plus minus infuscatis, aculeis numerosis ut in praecedenti ordinatis, instructi. Pedes-maxillares fusco-castanei, femore supra setis niveis miseriatis erectis longis crassis et obtusis insigniter ornato, patella tibiaque extus rubro-pilosis, longissimi et graciles; femore curvato; patella cylindracea, plus triplo longiore quam latiore; tibia paulo longiore vel saltem haud brevior, paulo graciliore, apophysi nigra depressa et obtusa, brevi et leviter extus arcuata, munita; tarso parvo; bulbo simplici, ovato, ad basin retro-producto, obtuso atque arcuato.

Madagascar : Antongil (*Morquerys*).