

*Portia africana* (Simon, 1885)

LINUS (1) AFRICANUS, sp. nov. — ♂. Long. 7 mill. — Cephalothorax fuscō-rufescens albo et fulvo-pilosus, parte cephalica supra dilutiore et rufo-pubescente. Pili oculorum rufoli. Clypeus utrinque fere glaber macula media magna subtrapeziformi niveo-pilosa ornatus. Abdomen fuscum pilis subsquamosis albis rufisque dense vestitum et fasciculis validis setarum parce ornatum. Sternum sordide flavidō-pilosum et squamatum. Pedes fusci rufo alboque pubescentes, tarsis fulvis, tibiis infra longissime nigro-fimbriatis. Pedes-maxillares robusti flavi, femore infuscato, patella tibiaeque albo tarso flavo longe pilosis, tibia patella breviore, extus apophysa fulva validissima ad apicem paululum attenuata et incurva infra excavata fere perpendiculariter armata, subtus apophysa minore nigra et conica munita, tarso late ovato supra usque ad medium alte carinato prope basin minute dentato, bulbo magno ovato. — Congo : Landana (L. Petit).

*L. fimbriato* Dolesch. valde affinis, differt tarso pedum-maxillarium majore et altius carinato, apophysa tibiali exteriore obtusa (in *S. fimbriato* ad apicem abrupte acuta et uncata), etc.

(1) Nom nouveau proposé par M. Peckham pour remplacer celui de *Sinis* Thorell, employé antérieurement (Heer, Coléopt., 1862).