

Vinson, A. 1863. Aranéides des îles de la Réunion, Maurice et Madagascar. Paris: 83-84; 303-304.

Hovops madagascariensis (Vinson, 1863)

2^o SÉLÉNOPS DE MADAGASCAR. (*Selenops Madagascariensis*, Vinson.)
(Pl. III, fig. 3.)

Long. : 11^{mm}. *Femelle*.

Aspect général : Plus petit d'un millimètre 1/2 que le SÉNÉLOPS de l'île de la Réunion ; d'un jaune roux, maculé de taches larges plus brunes. — Corselet et corps très-plats. —

Le corselet est plat, large, arrondi en forme de disque : la tête est évasée en avant et coupée en ligne droite : elle est insérée comme un coin dans le thorax, qui forme presque un cercle interrompu seulement en avant pour la place de la tête et en arrière pour l'attache de l'abdomen. Le corselet est fauve, maculé de taches plus foncées.

L'abdomen est plane comme chez les *omalosomes*, et fait pour s'appliquer exactement sur la face des corps qu'il touche et où l'Aranéide est appelée à se mouvoir avec célérité : il est plus large près de sa base ; un peu en ligne horizontale vers le corselet, il s'arrondit

sur les côtés; les deux lignes qui le forment descendent ensuite parallèlement en se courbant doucement l'une vers l'autre, de façon à terminer l'abdomen par une pointe mousse. Sa couleur est fauve, avec de larges taches plus foncées et qui laissent entre elles des lignes plus claires qui circonscrivent ces taches et qui les rendent très-apparentes.

Les pattes sont jaunâtres, légèrement annelées. Le dessous du corps est fauve jaunâtre, uniforme. Ce SÉLÉNOPS est très-répandu dans les villages intérieurs de Madagascar, lorsqu'on commence à s'élever dans les montagnes. On le trouve également dans toute la ville de Tananarive. — Ses mœurs sont nocturnes; il n'apparaît que lorsqu'il fait nuit: il sort alors de dessous la paille des toits, ou se glisse hors de la fente des boiseries ou des parois des habitations. Là ce SÉLÉNOPS s'applique contre la surface des corps comme s'il y adhérerait: et si on veut le toucher ou le prendre il se déplace avec une incroyable promptitude.

Ce SÉLÉNOPS est bien différent de celui de Dufour (*Selenops Dufourii*, Vinson), et beaucoup plus commun dans son habitat que ce dernier à l'île de la Réunion.

24. **SELENOPS MADAGASCARIENSIS**, Vins. Cephalothorace planissimo, panè circinato, fusco cum maculis intensioribus

Abdomine planissimo, ovato, elongato, propè basim largiori fusco cum maculis intensioribus, inter quas lineæ clariores; pedibus fuscis cum annulis tigrinis; subtus, corpore flavo fusco colorato.

Habit. — *Madagascar*.

In tenebris, in domorum muris ambulat.

