

Simon, E. 1880. Révision de la famille des Sparassidae (Arachnides). Act. Soc. linn. Bord. 34: 242-243.

1. **Damastes Grandidieri** *sp. nov.*

♀) Céph.th., long. 11,4; larg. 13,5. — Abd., long. 18,5; larg. 17. — Pattes: 1<sup>re</sup> paire 34,5; 2<sup>e</sup> paire 41,4; 3<sup>e</sup> paire 34; 4<sup>e</sup> paire 31,5.

Céphalothorax brun-rouge très foncé à pubescence blanchâtre assez longue et couchée, mêlée de forts crins à la marge et au bord frontal, entièrement plat, arrondi latéralement, largement tronqué au bord postérieur et marqué au milieu d'une faible échancrure obtuse; partie céphalique très courte et très large, droite aux angles et tronquée droit en avant, marquée en dessus au milieu d'une large dépression transverse; impressions latérales larges et profondes; front marqué d'une carène obtuse, un peu arquée en arrière, passant dans l'intervalle des yeux médians. — Yeux médians formant un trapèze beaucoup plus large que long et beaucoup plus étroit en avant, les antérieurs plus de deux fois plus gros, leur intervalle au moins d'un tiers plus étroit que leur diamètre; intervalle des postérieurs ayant plus de quatre fois leur diamètre; yeux latéraux très largement séparés des médians, un peu plus petits que les antérieurs, mais beaucoup plus gros que les postérieurs, égaux, légèrement

soulevés, en ligne oblique, leur intervalle environ égal à leur diamètre. — Bandeau très étroit, finement rebordé. — Chélicères très robustes, très larges et convexes, noires, lisses, garnies de crins fauve rougeâtre inégaux. — Abdomen déprimé, tronqué en avant, fortement élargi et arrondi en arrière, en dessus noirâtre taché de fauve : trois larges bandes transverses élargies dans le milieu, renfermant chacune un trait brun transverse plus court et arqué, pubescence courte mêlée de très long crins; ventre fauve clair testacé. — Plastron brun-rouge clair très pubescent; pièces buccales noires.— Pattes brun-rouge très foncé, garnies de pubescence fauve courte, mêlée de nombreux crins fauves, très forts et très longs; tibia et patella IV (réunis) de même longueur que le céphalothorax; tibia II plus court que la largeur du céphalothorax, au moins des deux tiers de la patella; tibia IV pourvu de 3-2 épines inférieures, sans épines latérales ni dorsales; fémur I sans épines sur la face antérieure, pourvu en dessus de deux épines très espacées, et de trois épines externes; patellas pourvues aux quatre paires d'une seule très petite épine sur la face postérieure; scopulas très épaisses, atteignant la base des métatarses. — Epigyne présentant en avant une fossette cordiforme, un peu plus large que longue, entièrement divisée par une carène étroite plus basse que les bords, et renfermant en arrière une pièce noire transverse, lisse presque aussi large que la fossette.

Madagascar (Muséum de Paris, rapporté par M. Grandidier).