

Strand, E. 1907. Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. Zool. Anz. 31: 735-736.

*Damastes nossibeensis* Strand n. sp.

♀ subad. Cephal. ohne deutliche Quergrube. Beine länger als bei *D. grandidieri* Sim. Am unteren Fälzrande 5, am oberen ein großer und zwei winzige Zähne. Hintere Augenreihe so stark procurva, daß eine die M.-A. vorn tangierende Gerade die S.-A. kaum schneiden würde. Abdomen an der Basis quergeschnitten; von diesen Ecken bis zur Hinterspitze gleichmäßig gebogen, die größte Breite in der Mitte. Cephalothorax und Extrem. rot oder bräunlichrot, Femoren unten vorn in der Basalhälfte schwärzlich, Mand. violettschwarz; Sternum orange-gelb, vorn mitten rot; die beiden dunklen mittleren Querbinden des Abdominalrückens breiter, unregelmäßiger und unter sich durch zwei schmale Längsstreifen verbunden, aber ohne zwei Schrägflecke zwischen denselben, der Mittelfleck der hinteren Querbinde ebenso groß wie die beiden Seitenflecke, eine dunkle Querbinde an der Basis nur angedeutet. Auch die Spitze der Tibien I—II scopuliert. Sonst mit *D. malagassus* (Karsch) verwandt. — Totallänge (NB. unreif!) 29,5 mm. Cephal. 10—11 × 12,3 mm. Abd. 16 × 13 mm. Beine: I. 40,2; II. 50,5; III. 39,5; IV. 36 mm. — Nossibé (Reuter) [M. L.].