

Strand, E. 1908. Neue aussereuropäischer Spinnen.  
Zool. Anz. 33: 5.

*Eusparassus laterifuscus* Strand n. sp.

♂ subad. Vordere Augenreihe ganz schwach procurva, die M.-A. kaum größer, unter sich um  $\frac{2}{3}$  ihres Durchmessers, von den S.-A. um kaum den Radius entfernt; letztere vom Rande des Clypeus etwa in ihrem Durchmesser, von den hinteren S.-A. kaum so weit entfernt. — Alle Patellen vorn und hinten je 1, alle Tibien unten 2, 2, 2, vorn und hinten je 1, 1, alle Metat. unten 2, 2, I—II vorn und hinten je 1 nahe der Basis, III—IV vorn und hinten je 1, 1, IV noch 2 kleinere Stacheln jederseits an der Spitze. — Äußere Ähnlichkeit mit *Olios malagassus* Strand, jedoch Abdomen und Mandibeln abweichend gefärbt, die Größe bedeutender usw. — 17 mm (NB. unreif!). Cephal.  $7 \times 6,8$  mm. Abdomen  $8,5 \times 5$  mm. Beine: I. 31; II. 34,1; III. 23,7; IV. 26,3 mm. Pat. + Tib. I 13, IV 10,3 mm. Palpen 10,5 mm; Pat. =  $\frac{1}{2}$  Femoralglied. — Madagaskar (Stumpff).