

Vinson, A. 1863. Aranéides des îles de la Réunion, Maurice et Madagascar. Paris: 98-100, 304-305.

Heteropoda venatoria (Linnaeus, 1767)

3^o OLIOS LEUCOSIE. (*Olios leucosius*, Walckenaer.)

(Pl. II, fig. 3.)

Synonymie : *Thomisus venatorius*, Latreille. — *Aranus venatorius*, Linné (1).

Long. : 28^{mm} et quelquefois 30^{mm}. *Femelle*.

« Abdomen ovale, allongé, plus étroit que le corselet, d'un brun fauve, uniforme, avec des points enfoncés sur le dos. Ventre de couleur plus pâle. Corselet, bouche, sternum d'un fauve doré uniforme. Le corselet a une raie longitudinale et des sillons en rayons, aboutissant aux pattes, marqués par des poils bruns; une tache brune » en long sur l'abdomen, près de sa partie antérieure. Le bandeau est blanc.

Les mandibules sont rougeâtres, rayées longitudinalement de noir.

(1) BIBLIOGRAPHIE DE L'OLIOS LEUCOSIUS : — Walckenaer, *Hist. nat. des Ins. Aptères*, t. I, pages 566-68. — *Ibid.* *Tableau des Aranéides*, page 36, n. 28, pl. 4, fig. 33. — *Thomisus venatorius*, Latreille, *Gener. Insect.* t. I, page 114, spec. 7. — Sloane, *Hist. of Jamaica*, page 185, t. II, page 235, fig. 1 et 2. — *Aranus venatorius*, Linn. *Syst. nat.* page 1035, 33.

Mâle. Le mâle a le corselet d'un brun marron à sa partie postérieure, et est entouré d'une bande blanchâtre « qui rejoint celle du bandeau. Il est plus petit. La cupule de son digital est ovale, allongée, pointue à son extrémité, et recouvre un conjoncteur globiforme armé d'un crochet recourbé. — Très-commune à l'île de France, dit Walckenaer, d'où je l'ai reçue en grand nombre..... L'individu le plus grand avait 14 lignes, et la deuxième paire de pattes avait 27 lignes. La plupart des individus n'avaient que 8 à 10 lignes (1). »


La conservation apportant des modifications de couleur, nous avons dû rectifier, dans les endroits indiqués, la description faite par Walckenaer. Ainsi rien de jaune sur nature; le corselet est bordé de blanc sale, il est vrai, et cette bordure est plus large en arrière; elle se rétrécit de chaque côté en rejoignant le bandeau, qui est d'un blanc fauve.

Sur l'abdomen il y a une raie marron foncé qui s'arrête au milieu, entre deux points noirs. Plusieurs petits points après ceux-ci, et souvent de chaque côté une ligne plus foncée en zigzag. Les mandibules, sur le sujet vivant, sont d'un noir rougeâtre. Les raies longitudinales ne se voient que sur l'Araignée conservée.

(1) WALCKENAER. *Hist. nat. des Ins. Aptères*, page 566.

Cette Aranéide a un gros cocon, de la circonférence d'une pièce d'un franc au moins, aplati comme un disque et de l'épaisseur d'une ligne; elle le tient avec ses palpes et ses mandibules. Ce cocon s'ouvre, par la circonférence, en deux disques égaux, pour donner passage aux petits éclos. Vers cette époque, l'insecte frappe à petits coups redoublés contre les meubles ou les cloisons son cocon, qui finit par se fendre en deux, et qui rend un son particulier dans cette percussion répétée.

L'*Olios leucosius* habite la Réunion, Maurice et Madagascar.



28. **OLIOS LEUCOSIUS**, *Walck.* Colore aurato-fulvo, plus minus diluto distincto. Cephalothorace albo-marginato cum sulcis radiantibus crassioris coloris. Abdomine ovato, in longum producto, fuscii coloris dilutè-fulvi, unius et æquabilis, cum punctis depressis et aliquoties cum duobus lineis fuscis, multangulis, ex utroque latere, super abdomen. *Mari* est cephalothorax fuscus cum litterâ V albâ. — Pedes maximi, robusti, aurato-ravi et validis pilis muniti sunt. (*Vinson, 1863: 305*).

Habit. — *Réunion, Maurice, Madagascar.*