

Strand, E. 1907. Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. Zool. Anz. 31: 737.

Olios subpusillus Strand n. sp.

♀ subad. (?). Mit *Olios pusillus* Sim. verwandt, aber Cephal. länger als Pat. + Tib. IV, Augenstellung ein wenig abweichend, Sternum nicht dunkler punktiert, Abdominalrücken mit vier dunklen Punktstellen usw. — Vordere Augenreihe gerade; die M.-A. größer, unter sich und vom Clypeusrande um $\frac{2}{3}$, von den hinteren M.-A. um den ganzen Durchmesser, von den vorderen S.-A. um den Radius entfernt. Hintere Reihe gerade, alle Augen kleiner als die vorderen, gleichgroß und gleich weit unter sich entfernt. Feld der M.-A. so lang als hinten breit, vorn nur wenig schmaler. Epigyne erscheint als eine matte, kaum gewölbte Fläche, die hinten eine feine, eingedrückte Längslinie zeigt, die sich am Hinterende zu einer dreieckigen Grube erweitert (kaum reif!). — 8 mm. Cephal. $3,3 \times 3$ mm. Abd. $5,5 \times 3,5$ mm. Beine: I. 13,7; II. 14,8; III. 9,7; IV. 11,2 mm. Palpen 4,5 mm. — Majunga (Voeltzkow [M. B.]).