

Strand, E. (1907. Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. Zool. Anz. 31: 737.

*Palystes spiralis* Strand n. sp.

♂. Cephal. und Extrem. rötlichgelb, Mandibeln rot mit schwarzer Spitze; Abdomen ockergelblich, oben etwas gebräunt. Vordere Augenreihe unten leicht procurva, alle Augen größer als die der hinteren Reihe; die M.-A. kleiner, unter sich um ihren Radius, von den S.-A. nur halb so weit entfernt; letztere vom Clypeusrande um ihren Radius, von den hinteren S.-A. um kaum den Durchmesser der letzteren entfernt. Alle Patellen vorn und hinten je 1; alle Tibien unten 2, 2, 2, vorn und hinten je 1, 1, I—II oben 1, 1, III—IV oben nur 1 Stachel; alle Metat. unten 2, 2, vorn und hinten je 1, 1, IV außerdem an der Spitze vorn und hinten je zwei kleine Stacheln. — Tibialglied gegen die Spitze leicht erweitert, nicht ganz doppelt so lang als an der Spitze breit, daselbst oben innen mit einem kleinen stumpfen Zahn, außen einem viel größeren, horizontal nach vorn und außen gerichteten Fortsatz, der so lang als das Glied breit ist und am Ende fast rechtwinkelig nach unten gebrochen; der umfangreiche Bulbus mit langer, feiner Spirale, die an *Delena* erinnert. — Nossibé (Reuter) [M. L.].