

Simon, E. (903. Descriptions d'arachnides nouveaux de Madagascar, faisant partie des collections du Muséum. Bull. Mus. hist. nat. Paris 9: 138.

*Rhitymna fasciolata*, nov. sp. — ♂ long. 16 millimètres.

Cephalothorax rufescens, crebre albo-pubescentis sed vitta frontali nigra et fere glabra antice marginatus. Oculi medii antici lateralibus paulo majores et a lateralibus quam inter se saltem duplo remotiores. Abdomen breviter oblongum, fulvum, crebre albido-luteo-pubescentis. Chelae validae, nigrae, opacae, parce nigro albidoque crinitae, margine inferiore sulci dentibus validis trinis denteque ultimo parvo, instructo. Partes oris castaneae. Sternum pedesque fulva, albido-pubescentia et longe hirsuta. metatarsis tarsisque anticis valde infuscatis, aculeis ordinariis. Pedes maxillares fulvo-rufuli, femore dilutiore; tibia patella paulo brevior, apophysi apicali nigra, crassa, inflexa, supra profunde sulcata, apice oblique secta, cum angulo inferiore producto atque acuto, extus armata; tarso ovato; bulbo ovato, simplici. - Amborombe (Decorse, 1901); Ambolisitra (G. Grandidier, VII, 1898).




FIG. 3. *Rhitymna fasciolata* E. S. ♀, dessin de L. Berlaud.




FIG. 4. a, *Rhitymna fasciolata*, épigyne; épigyne.  $\times 22$ .

[From Fage, 1926. Sur quelques araignées de Madagascar, nouvelles ou peu connues et sur leur curieuse industrie. Arch. zool. expér. gen. 65: 9, figs. 3-4a].