

Vinson, A. 1863. Aranéides des îles de la Réunion, Maurice et Madagascar. Paris: 95-97, 304.

*Rhitymna imerinensis* (Vinson, 1863)

2° OLIOS IMERINA (*Olios Imerinensis*, VINSON).

LONG. : 13<sup>mm</sup> 1/2. *Femelle*.

*Aspect général.* Corselet rouge brun, abdomen cordiforme, d'un rouge brun plus foncé, garni de petits poils dorés. — Pattes de même couleur : dernier article et le digital plumeux. —

— Le corselet est large et plat, arrondi, uniformément bombé dans toutes ses parties : il est circulaire, plus étalé dans sa partie moyenne. La tête est large, aplatie, carrée et voûtée sur les côtés, où il y a une petite dent qui se recourbe et s'applique sur la face externe des mandibules. Le corselet est d'un rouge brun, recouvert en partie d'un duvet fin, ras et soyeux, d'un blond doré.

L'abdomen est en cœur, terminé en pointe, un peu moins large que le corselet : il est d'un brun rougeâtre bien plus foncé que le corselet, et tirant sur la couleur marron foncé : il est revêtu uniformément d'un duvet fauve doré, fin, abondant, ras et soyeux.

Les pattes sont fortes, étalées, recouvertes d'un duvet grisâtre, presque blanc, avec des reflets soyeux ou argentés. Elles sont d'un rouge noirâtre, surtout près des articulations : elles sont très-noires à leur extrémité; le dernier article et le digital sont dilatés et ornés latéralement d'un duvet plumeux, roux et épais en forme de brosse. La poitrine et l'insertion des pattes sont d'un rouge brun : les pattes sont noires en dessous : palpes brun rougeâtre foncé.

Le ventre est fauve avec une dépression large de la vulve ou des plaques pulmonaires aux filières, situées à l'extrémité du corps de l'Aranécide.

Les mandibules sont noires, luisantes, bombées, larges supérieurement, étroites inférieurement, évidées en dedans, où elles sont hérissées d'une double rangée de poils courts, raides et rouges.

Les yeux sont noirs : les médians de la ligne antérieure sont sensiblement plus gros que les autres.

<i>Mesures.</i> Longueur du corselet	. .	5 <sup>mm</sup> 1/2.
Largeur.	— . .	7 <sup>mm</sup> 1/4.
Longueur de l'abdomen.	. .	8 <sup>mm</sup> 1/2.
Largeur.	— . .	6 <sup>mm</sup> 3/4.
Première paire de pattes.	. .	20 <sup>mm</sup> .
Deuxième.	— . .	25 <sup>mm</sup> .
Troisième.	— . .	18 <sup>mm</sup> .

Ce bel *Olios* se trouve à Tananarive et dans les environs de la capitale de Madagascar : il se tient dans les feuilles qu'il enroule, et habite les jardins. Il a les mêmes mœurs que l'*Olios captiosus* ; son cocon est orbiculaire : ses petits en naissant sont d'un beau vert bleuâtre ou vert glauque. — Pris dans le jardin de M. Laborde, au pied de Tananarive.

Vinson, 1863: 304.

27. **OLIOS IMERINENSIS**, *Vins.* Thorace rubro-fusco. Abdomine cordis speciem representante, rubro-fusco intensiore quam corporis alia partes, pilis auratis contexto.

Pedibus rubro-fuscis, robustis; tibiis et tarsis pilosissimis.

Habit. — *Imerinia, Madagascar.* — In hortis inter folia arborum.