

Fage, L. 1926. Sur quelques araignées de Madagascar, nouvelles ou peu connues et sur leur curieuse industrie.
Arch. zool. expér. gen. 65: 10, fig. 4b.


Rhitymna malagassa nov. sp.

♀. — Coloration du céphalothorax rougeâtre, rembruni en avant ; chélicères brun-rouge à la base, noirâtres au sommet : abdomen gris, varié de noir. Pièces buccales brun-rouge. Sternum et pattes fauve-rougeâtre avec un anneau brun à la base des tibias et les métatarses rembrunis. Pubescence blanche. — Marge inférieure des chélicères armée de trois fortes dents et d'une quatrième dent beaucoup plus petite ; deux dents à la marge supérieure. — Armature des pattes comme dans l'espèce précédente. — Epigyne (fig. 4, b) en plaque plus longue que large ; lobes latéraux épais, contigus en arrière sur la ligne médiane, limitant une fossette arrondie, profonde, bordée de noir et dépourvue de pièce médiane.

Longueur du corps : 11 mm. ; longueur du céphalothorax : 6 mm. ; tibia I : 5 mm.

Habitat : Madagascar (Tamatave), 1 ♀ in coll. E. Simon.

Le genre *Rhitymna* est représenté à Madagascar par les espèces suivantes : *R. decorata* E. S., *R. fasciolata* E. S., *R. nigrichelis* Strand, *R. Hildebrandti* Järvi, auxquelles il faut ajouter le *R. malagassa* décrit ci-dessus. Les autres espèces du genre sont de Java sauf : *R. valida* (Bl.) des Seychelles qu'on trouve aussi dans l'Ouest Africain, en compagnie du *R. saccata* Järvi.



b.

Rhitymna malagassa, épigyne. × 22.