

Vinson, A. 1863. Aranéides des îles de la Réunion, Maurice et Madagascar. Paris: 271-273, 317.

Argyrodes zonatus (Walckenaer, 1842)

2° LINYPHIE ZONÉE (*Linyphia, zonata*, Walckenaer).

(Pl. XI, fig. 1, 1, a.)

Long : 5 à 7^{mm} (1). — *Femelle*.

Abdomen ovale, allongé, renflé dans son milieu, graduellement évidé à sa partie postérieure, qui est relevée verticalement, et qui présente la figure d'une pyramide conique allongée. Le ventre forme un angle dont la pointe est dirigée en bas, et dont la forme est triangulaire. Le fond de l'abdomen d'un rouge brun, qu'un léger duvet fait quelquefois paraître jaune grisâtre.

Les côtés ont six raies qui alternent en noir foncé et en couleur blanche argentée, avec un petit reflet jaunâtre ou doré sur le bord des raies blanches. Une demi-raie, entre la deuxième et la dernière, s'arrête court sur le dos. La raie ou bande qui est dans le milieu de l'abdomen, se recourbe jusqu'aux filières, qui sont sous le ventre plus rapprochées du corselet que de l'extrémité de l'abdomen. — La raie de couleur métallique qui est proche du corselet est courte; elle se termine en pointe, et n'atteint pas celle du milieu, qui va jusqu'aux filières. — Le

(1) La plus forte LINYPHIE ZONÉE que j'aie rencontrée avait 7^{mm}; la hauteur de l'abdomen, des filières au dos, 5^{mm}.

dos est d'un rouge brun dans le milieu (la présence de petit duvet court, blanchâtre, peut donner à cette partie de l'Aranéide conservée la couleur gris sale indiquée dans la description de Walckenaer). Sur les côtés sont des traits (ou des points) argentés formés par des raies latérales dont l'extrémité commence à côté du dos. (De ce nombre la demi-raie qui existe entre la deuxième et la troisième raie argentée, rouge en dessous du ventre.) Les raies ou bandes latérales noires se réunissent sous la forme d'un V. Les filières sont rougeâtres avec les extrémités brunes.

Le corselet est petit, glabre, allongé, rougeâtre, bombé vers la tête, qui est noire et proéminente. Le bandeau est grand et rougeâtre comme dans la LNYPHIE PARASITE. Le sternum est rouge brun ou noirâtre.

Les mandibules sont droites et tombent perpendiculairement; elles sont d'un rouge pâle.—Les mâchoires sont droites, écartées, à côtés droits et parallèles, mais s'élargissant vers leur extrémité, qui est large et carrée.—Ces mâchoires sont rougeâtres ainsi que la lèvre, qui est grande, triangulaire, large à sa base, émoussée ou arrondie à son extrémité. Les pattes sont allongées, fines. La première paire surpasse de moitié la seconde en longueur : celle-ci est ensuite la plus longue, la troisième est la plus courte. Ces pattes sont brunes,

mais le tibial de la première paire est d'un jaune pâle. Cette première paire a 14^{mm} de longueur.

Walckenaer, qui donne la description de cette LINYPHIE dans son *Histoire des Ins. Apt.*, p. 282, tom. II, dit que cette Aranéide a été envoyée de l'île de France par Desjardins, et qu'il a dû la classer dans les LINYPHIES, à cause de la conformation des mâchoires et de la lèvre.

Parmi les LINYPHIES ZONÉES, il y a beaucoup de variétés pour les couleurs de rouge, d'or et d'argent: on en rencontre même qui sont jaunes(1): J.-B. Dumont décrit celle-ci de la manière suivante: — « *Araignée tendeuse conoïdale*: 4 lignes de long. Corselet très-petit, d'un jaune d'ambre un peu rougeâtre. Yeux noirs très-rapprochés; les palpes de la même couleur que le corselet. Abdomen gros, formant un cône circulaire dont la base arrondie est tournée en avant; l'extrémité pointue et d'un jaune vif. Le dessus d'un brun jaune; le dessous d'un beau noir. Les côtés marqués de bandes blanches argentines qui s'étendent jusqu'en dessus; mamelons noirs placés sous la base. J'ai trouvé, dit-il, cette Araignée sur la toile de l'Araignée tendeuse géante (*Epeira inaurata*). Les deux yeux latéraux confondus (2). »

(1) Toutes ces zones argentées ont souvent un reflet doré, surtout sur leur contour. — (2) J.-B. DUMONT. *Manuscrit*.

69. **LINYPHIA ZONATA**, *Walck.* Abdomine obovato, producto, tumescente in medio, gradatim minuiore in parte posteriore ita ut efficiat pyramidam fastigatam productam. Abdomine fusco-rubro vel ravo. In lateribus sex lineæ alternæ nigro et auro aut nigro et albo.

Thorace parvo, glabro, producto, subrubro, convexo ad caput, nigrum et prominens.

