

Vinson, A. 1863. Aranéides des îles de la Réunion, Maurice et Madagascar. Paris: 283-284, 318-319.

Nesticodes rufipes (Lucas, 1846)

1° THÉRIDIION DE L'ILE BOUBBON (*Theridion Borbonicum*, Vinson).

(Pl. XIV, fig. 6.)

Long. : 5^{mm}.

Aspect général. — Corselet et pattes d'un jaune rougeâtre; abdomen d'un gris brun.

Céphalothorax ovoïde, en forme de cœur; tête petite, portant à son extrémité antérieure, sur deux rangées, les yeux dont les latéraux sont connivents; leur couleur est d'un vert glauque avec des reflets violâtres par incidence, ils paraissent être d'égale grandeur, surtout le carré intermédiaire. (Pl. XIV, fig. 6, *a.*)

Le corselet est arrondi sur les côtés et postérieurement, bombé en dessus, d'un jaune d'ambre rougeâtre.

Les pattes fines et allongées sont de la même couleur jaune rougeâtre, sétacées ou bien armées de petits poils raides, fauves et nombreux. La première paire est la plus longue; la quatrième, moins; la troisième est la plus courte.

L'abdomen est ovoïde, recourbé en arrière, bombé en dessus, terminé en pointe en bas ; sa couleur, différente du thorax et des pattes , est d'un gris blanchâtre ardoisé, avec des stries, des marbrures ou des taches brunes foncées. Il est recouvert de petits poils soyeux. Le ventre est d'un gris fauve ; les filières coniques et allongées occupent en dessous l'extrémité de l'abdomen ; elles sont entourées d'un cercle brun qui se prolonge sous le ventre.

La poitrine a la forme d'un écusson triangulaire de la même couleur que le dessus du thorax.

Les mâchoires sont longues, étroites en bas, très-dilatées à leur extrémité supérieure ; elles sont rouges et terminées en brun.

Les palpes sont allongés et très-velus

On trouve cette Aranéide derrière les vieux meubles dans l'ombre en compagnie de la Scytode thoracique ; elle a les mêmes mœurs, la démarche égale ; elle jette des fils irréguliers et très-fins, et forme un cocon globuleux terminé en pointe supérieurement et de couleur marron.

Cette Araignée, dont les mœurs sont essentiellement nocturnes, habite l'île de la Réunion

73. **THERIDION BORBONICUM**, *Vins.* Cephalothorace ovato; capite parvo cum oculis in duobus ordinibus dispositis et violaceo colore nitentibus.

Thorace rotundo, suprà clato; succini colore rubro-flavo.

Abdomine suprà rotundo, piloso, setoso, cinereo cum nigris obliquatisque fasciis. Ventre fusco-ravo.

Pedibus elongatis, gracilibus, pilosis et flavo-rubris. Pedes anteriori et posteriori sunt longiores.

Habit. — *Réunion.*

6^a



6

