

Vinson, A. 1863. Aranéides des îles de la Réunion, Maurice et Madagascar. Paris: 258-261, 316.

Zosis geniculata (Olivier, 1789)

1^o ULOBORE DE L'ILE BOURBON. (*Uloborus Borbonicus*,
Vinson.)

(Pl. I, fig. 3, 3, a.)

Long. : 8^{mm}. — *Femelle*.

L'abdomen est allongé, ovale et gibbeux vers son milieu, qui est surmonté d'un tubercule noir, conique. A partir de ce point, l'abdomen suit une double inclinaison; une en avant; une en arrière, ou il se termine en pointe. Sa couleur est d'un gris brun, plus ou moins foncé, et quelquefois cendré, plus brun postérieurement vers les filières.

En avant de l'abdomen une ligne blanchâtre, pâle, transverse, va en serpentant se ramifier sur les côtés avec les bandes dorsales de même couleur.— En avant et au-dessus, séparée par une ligne brune, s'offre une seconde bande plus large et plus courte, terminée en pointe de chaque côté, interrompue au milieu par un trait brun qui va jusqu'au tubercule noir.

Sur la partie de l'abdomen, inclinée postérieurement, quatre à six points blancs, comme perlés, sont disposés par paires sur deux rangées parallèles.

Du centre de l'abdomen partent trois lignes blanchâtres, mal indiquées d'abord, vagues, comme effacées, mais qui, plus prononcées et s'élargissant à mesure qu'elles descendent sur les côtés, circonscrivent des anneaux allongés en se ramifiant avec la ligne blanchâtre qui vient de la partie antérieure, et qui semble servir de limite entre le ventre et l'abdomen.

Ventre brun foncé avec un carré long, noir, encadré d'un fin liséré blanc, régulier.

Corselet allongé, rétréci en avant, dilaté ensuite : brun avec une bande transparente de chaque côté; traversé par une ligne blanche qui s'élargit postérieurement en demi-cercle et qui, en avant, communique avec un petit carré blanc qui porte les yeux postérieurs, qui sont noirs.

Les mandibules sont rougeâtres. Les pattes et les palpes sont annelés de blanc et de noir.

La paire antérieure est la plus longue et la plus forte, puis la quatrième paire. L'Araignée les tient, deux en avant et deux en arrière, étendues sur sa toile. Son cocon anguleux est de la couleur d'un sac de soie lilas ou rosée.

Mâle. — Plus petit que la femelle ; l'abdomen plus brun et moins gibbeux, plus cylindrique; ses palpes sont enflés en forme d'olive.

Cet ULOBORE est très-commun dans les caves, dans les habitations, dans les lieux sombres. — Quoique nocturne, cette Aranéide n'est pas très-velue. Elle habite également les îles de la Réunion, Maurice et Madagascar (Tamatave).

J.-B. Dumont ne devait pas omettre de décrire une Aranéide aussi répandue.

Voici cette description :

— « *Araignée tendeuse, petit deuil ou à pattes étendues*. 3 ou 4 lignes. — Noire, tachée de blanc. Corselet petit, allongé, un peu élargi ; une bande blanche peu apparente en dessus ; bordé de même couleur. Yeux noirs, posés sur deux lignes ; palpes annelés de noir.

» Abdomen gros, ovale, un peu allongé, presque cylindrique. Noir : quatre points blancs en dessus, ondé de même couleur sur les côtés. La base est saillante, arrondie, tournée en haut, nuancée de blanc, surmontée d'un petit mamelon noir. — Mamelons gros, noirs, placés à l'extrémité de l'abdomen. — Pattes assez grosses, irrégulièrement annelés de blanc ; les quatre antérieures étendues horizontalement en avant, comme l'*Araignée pattes étendues* de l'Encyclopédie. — Elle file une toile lâche et se tient dans le centre, sur une partie de la toile plus blanche et plus fournie. Cette Araignée enferme ses œufs dans une

coque d'environ quatre lignes de diamètre, d'un violet pâle, opaque, très-convexe d'un côté, presque plane de l'autre. Son contour est entouré d'angles aigus, qui lui donnent la forme étoilée. J'ai trouvé ces coques au nombre de deux, placées verticalement sur le bord d'une toile. Très-commune dans les maisons (1). »

65. **ULOBORUS BORBONICUS**, *Vins*. Abdomineelongato, ovato, gibbero in medio, cum tuberculo nigro; ab eo tuberculo, abdomen dejecta rapido antè vergit, circumnatura autem in parte posteriore, quæ desinit in acumen. — Colore cinereo cum fasciis albis obliquis et transversariis. In eâ parte abdominis quæ post flectitur, quatuor sunt aut sex puncta alba, quasi baccata, bina disposita duobus ordinibus parallelis. Ventre spissè-fulvo, cum quadrato longo, nigro, quod exprimitur tenui fasciâ albâ. Thorace fusco, clongato, antè angusto, post verò dilatato.

Réunion, Mauritius, Madagascar.

