

Strand, E. 1907. Vorläufige Diagnosen afrikanischer und südamerikanischer Spinnen. Zool. Anz. 31: 549.

Gen. *Pseudohermacha* Strand n. g.

Mit *Hermachastes* verwandt, aber die hinteren Sternalsigillen marginal, Endglied der Spinnwarzen nicht kürzer als das Mittelglied, Lippen- teil unspinuliert, S.-A. näher beisammen stehend usw.; von *Hermacha* abweichend: Vorderbeine mit deutlicher 3. Kralle; vordere Metatarsen nicht bis zur Basis scopuliert; von *Lepthereus* durch die spinulierten Palpencoxen zu unterscheiden. — Type: *Ps. annulipes* Strand.

Entypesa annulipes (Strand, 1907)

3. *Pseudohermacha annulipes* Strand n. sp.

♀ subad. Cephal. und Mandibeln hellbraun, Augenfeld schwarz, Sternum braun mit gelblichen Sigillen und gelblichem, undeutlichem Mittelfleck, Extremitäten gelb, Femoren, Tibien und Metatarsen braun geringt. Abdomen oben schwarz, mit kleinen hellgrauen Fleckchen, die sechs recurva gebogene, aus je 6 Flecken bestehende Querreihen bilden; Seiten unregelmäßig heller gefleckt; Bauch braun mit zwei graugelblichen Querbinden. Vordere Augenreihe etwa gerade; die M.-A. ein wenig größer, unter sich um ihren Radius, von den S.-A. um weniger entfernt. Hintere Reihe vorn gerade; die M.-A. kleiner, von den vorderen M.-A. um weniger als ihren kürzesten Durchmesser, von den hinteren S.-A. um ihren kürzesten Radius entfernt. — Totallänge (NB. unreif!) 9—10 mm. Cephal. $4 \times 2,8$ mm. Beine: I. 10,9; II. 9,3; III. 8,6; IV. 11,7 mm. — Nossibé [M. L.].